


Taimikon varhaishoidon määrä suhteessa tarpeeseen maakunnittain

Jokaisessa taimikossa tulisi tehdä varhaishoito noin viiden vuoden kuluttua uudistushakkuusta ja taimikon perustamisesta. Kartalla näkyy kemera-tuella vuosina 2018–2020 toteutetun taimikon varhaishoidon keskimääräinen osuus suhteessa vuosien 2012–2015 keskimääräisiin uudistamispinta-aloihin maakunnittain.



Kemera-tuella tehty taimikon varhaishoito maakunnittain vuosina
2018–2020, hehtaaria

Maakunta	Prosenttia tavoitteesta*)	Keskimäärin 2018–2020	2020	2019	2018
Kainuu	60	2125	2035	2350	1990
Keski-Pohjanmaa	57	880	774	844	1022
Pohjois-Savo	48	3855	4107	3378	4080
Keski-Suomi	47	3557	4236	3324	3110
Etelä-Pohjanmaa	46	2566	2745	2423	2529
Päijät-Häme	44	1546	1828	1378	1432
Etelä-Savo	41	3721	4062	3339	3762
Kymenlaakso	41	1301	1476	1196	1232
Pohjois-Karjala	39	2602	3154	2298	2353
Pohjois-Pohjanmaa	38	4171	4888	3808	3818
Pirkanmaa	36	2231	2830	2170	1692
Varsinais-Suomi	34	1337	1455	1387	1169
Satakunta	34	1235	1324	1334	1047
Etelä-Karjala	32	1330	1582	1186	1223
Pohjanmaa	32	1014	1129	862	1050
Kanta-Häme	31	1003	1193	884	931
Uusimaa	29	1178	1412	1006	1116
Lappi**)	21	1458	1383	1466	1524
Yhteensä	39	37108	41613	34632	35079

*) Luku kertoo, kuinka paljon taimikon varhaishoitoa on tehty kemera-tuella suhteessa keskimääräiseen uudistamisen pinta-alaan. Mitä suurempi luku on, sitä parempi on taimikoiden hoidon tilanne.

***) Lapissa taimikoiden varhaishoitoon tilanne on laskennallista arvoa parempi. Kun porot syövät lehtipuuston havupuun taimikoista, niin silloin ei tarvita erillistä varhaishoitoa.